

Bipacksedel: Information till användaren

Viscotears 2 mg/g ögongel

Karbomer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Viscotears måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Viscotears är och vad det används för
2. Innan du använder Viscotears
3. Hur du använder Viscotears
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Viscotears ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. Vad Viscotears är och vad det används för

Viscotears ögongel ersätter tårvätskan vid fall av torra ögon. Viscotears ögongel fuktar ögonen och bildar en skyddande film, som kan kvarstå i upp till 6 timmar.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angivet i bipacksedeln.

Karbomer som finns i Viscotears kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Innan du använder Viscotears

Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteketiketten, även om dessa skulle skilja sig från den informationen som ges i denna bipacksedel.

Använd inte Viscotears

- om du är allergisk (överkänslig) mot karbomer eller mot något av övriga innehållsämnen i Viscotears.

Var särskilt försiktig med Viscotears

- om du har kontaktlinser skall de tas ut före användning av Viscotears och inte sättas in igen förrän tidigast efter 30 minuter. Konserveringsmedlet cetrimid kan missfärga mjuka kontaktlinser.

Barn och ungdomar under 18 år

Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Viscotears som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.

Användning av andra läkemedel

Om du använder andra ögonläkemedel samtidigt med Viscotears bör du vänta 5 minuter mellan varje behandling. Viscotears droppas alltid i ögat som sista läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Får du dimsyn i samband med användning av Viscotears ögongel, bör du inte köra bil eller använda maskiner omedelbart efter att du droppat ögongelet i ögonen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En af faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/ eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du använder Viscotears

Använd alltid Viscotears enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos är 1 droppe i ögat 3-4 gånger dagligen eller vid behov.

Barn och ungdomar under 18 år

Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Viscotears som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.

Bruksanvisning:

Tvätta händerna. Dra ner det nedre ögonlocket med ett finger. Böj huvudet bakåt och håll tuben med ögongel lodrätt med spetsen nedåt i den andra handen. Pressa en droppe gel ur tuben och dosera gelet i bindhinnepåsen mellan ögat och det nedre ögonlocket. Undvik att beröra ögat med tubens spets.



Taben med ögongel bör stängas omedelbart efter användningen.
Undvik att beröra någon yta, ögat medräknat, med tabens spets då detta kan förorsaka skada på ögat och kontaminere gelen.

Om du har glömt att använda Viscotears

Om du har glömt att använda Viscotears skall du applicera ögongelen så fort du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Viscotears orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Ögon:

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Lätt övergående ögonirritation, klubbiga ögonlock och dimsyn.

Följande biverkningar har rapporterats (ingen känd frekvens) Överkänslighet, blodsprängda ögon, svullnad på ögats yttre yta (bindhinnan), svullna ögonlock, samt klåda och smärta i ögonen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Viscotears ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara taben lodrätt, med spetsen nedåt.

En öppnad tab är användbar i 4 veckor för enskild patient och 1 vecka för användning till flera patienter.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är 2,0 mg karbomer per 1 g ögongel.
- Övriga innehållsämnen är cetrimid (konserveringsmedel), sorbitol (E 420), natriumhydroxid (E 524) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Steril, halvgenomskinlig och färglös flytande gel.

Förpackningsstorlekar: 1 x 10 g och 3 x 10 g.

Innehavare av godkännande för försäljning

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin
Tyskland

Tillverkare

Dr Gerhard Mann Chem.-pharm Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin
Tyskland

eller

Laboratoires THEA
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrike.

Denna bipacksedel godkändes senast

2019-07-01